

08.04 V2R PROTOCOLO FRENTE A E.H.E. - enfermedad hemorrágica epizootica – Y D.N.C. – dermatitis nodular contagiosa

Protocolo preventivo. FRENTE A E.H.E. y D.N.C.

Administrar a libre disposición y de manera continuada, el bloque para lamer **gav-ALLFEED REPLYN / DUNE**

Gav-ALLFEED REPLYN DEFENSE WS250, es la versión soluble de REPLYN que permite ensulfatar el ganado – autorizado para la firma de certificados de responsabilidad para el traslado de ganado -, instalaciones, vehículos, utensilios y aperos, ...

Protocolo de rebaño con animales con cuadro clínico.

Ensulfatar el animal y todo el rebaño cada semana con gav-ALLFEED REPLYN DEFENSES WS250.

Administrar a libre disposición el cubo amezclado **gav-ALLFEED BRONKUB**

En lotes o ganaderías de alta producción (lecheras), siempre que sea posible, administrar vía agua : 70 – 100 ml por cada 1000 litros de **agua de bebida gav-ALLFEED TURBOBRONKIAL DW**

Protocolo individualizado de animales con síntomas clínicos.

Ensulfatar el animal y todo el rebaño cada semana con gav-ALLFEED REPLYN DEFENSES WS250.

Aplicar directamente **por el lomo** de los animales, y en la **parte perianal** **gav-ALLFEED .REPLYN DEFENSE WS250**, de manera preventiva **cada 7 días**, de manera clínica cada día hasta la recuperación de los animales afectados

Ensulfatar también instalaciones, aperos, botas, tractores, aperosAdministrar **vía fosa nasal 3 – 5 ml gav-ALLFEED TURBOBRONKIAL GOTAS O RESPIR**, cada 12 – 24 horas

Administrar **dentro de la boca**, humedeciendo toda la lengua, con **gav-ALLFEED TURBOBRONKIAL GOTAS O RESPIR**, para desinflamar la lengua, faringe y laringe, y permitir o mejorar e incrementar el consumo de agua por parte del animal.

Administrar en toda **la zona del cuello** (zona equivalente a la nuez en personas) **gav-ALLFEED LACTOMINT SPRAYGEL PLUS CARE**, para ayudar a desinflamar también la faringe vía externa.

, ...